

어린이 & 청소년 환자
만 7세 이상 미성년자

치아 우식 진단 차트



날짜:
환자 이름:

치아 우식 유발 요인

구강 건강에 영향을 끼치는 약물 복용
설탕이 함유된 약물, 시럽 등

해당 시



차상위계층, 이민자 자녀 등 사회경제적 요소

해당 시



교정장치 착용 여부

해당 시



플라그(바이오플름) 다양 축적

해당 시




설탕 섭취

≥ 일 4회
 ≥ 일 6회



최근 2년 이내 발생된 진행성 하얀 반점
병소 / 치아우식 / 수복

1개
 2개
 ≥ 3개 이상



검증되지 않은 예방법 시행

해당 시



TOTAL



치아 우식 예방 요인

일 1회
≥ 일 2회 이상

불소가 함유된 치약 사용

연 1회
연 2회
≥ 연 회 이상

GBT 혹은 치아 클리닝을 위해
치과를 방문하는 횟수

해당 시

기타 전문적인 예방법 시행



▶ 치아우식 유발요인을 줄이는 방법 :

빨간색이 초록색보다 많으면 치아우식 위험군에 속하며, 치아우식 예방을 즉시 실행해야 합니다.

With the assistance of Prof. med. dent. Adrian Lussi

EMS